ForêtGruyère

Association des propriétaires forestiers

# Parcelle de forêt à vendre

**RF n° 2252**

**Commune de Pont-en-Ogoz**

**Lieu dit : La Perreire**

**0.58 ha**

ForêtGruyère - Rue du Centre 30 – 1637 Charmey – 078 904 18 59 – alexandre.pipoz@foretgruyere.ch

**Descriptif :**

Parcelle forestière de 5813 $m^2$ sis sur la commune de Pont-en-Ogoz secteur le Bry au lieu-dit « La Perreyre ».

Le peuplement est composé majoritairement de résineux à divers stades de développement. Un peuplement d'origine artificielle d'épicéa a subi divers dégâts (versées et bostryches) ces dernières années. Le rajeunissement naturel s'installe bien et est composé de différentes essences feuillus en station ainsi que de sapins blancs et d'épicéas.

L'accès se fait par une route goudronnée de faible largeur venant depuis le sud (Avry-devant-Pont, route de la Tour puis route de Villars d'Avry) et longeant le massif à l'est ou par cette même route depuis le nord (Le Bry, route de Villars d'Avry et la route de l'Etrua). Un layon monte sur la crête sommitale du massif en traversant la parcelle voisine au nord.

Les exploitations futures devraient se faire en coordination avec les propriétés voisines afin de profiter du layon qui longe la crête au sommet du massif. Pour des interventions ponctuelles, le débardage avec un tracteur peut être imaginer, pour une exploitation plus globale, il serait préférable de remonter les bois sur le layon sommital à l'aide d'un câble-grue de courte portée.

En pièces jointes, vous trouverez :

- 1 plan de situation au 1 : 25’000
- 1 plan de situation au 1 : 5’000
- 1 plan du parcellaire au 1 : 2’500
- 1 carte des peuplements de la parcelle au 1 : 500
- 1 carte des peuplements du massif au 1 : 2'500. Attention seul le peuplement de la parcelle à vendre a été contrôlé.
- 1 carte des stations du massif au 1 : 2’500
- La clé cartographique des stations forestières des cantons de Berne et Fribourg pour les stations en présence.
- Le récapitulatif de l’estimateur synthétique donnant le volume sur pied de la parcelle ainsi que le nombre de tiges et la répartition des essences.

En cas d’intérêt pour cette parcelle, nous vous prions de prendre contact avec ForêtGruyère qui vous mettra en relation avec le propriétaire.

Charmey, le 16 septembre 2022

ForêtGruyère
Alexandre Pipoz
Forestier ES, chargé d’affaires
078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch

# Parcelle forestière à vendre

*Plan de situation*

***Descriptif:***

Parcelle n° RF: 2252
Commune: Pont en Ogoz
Lieu dit: La Perreire
Surface: 0,58 ha

0 500 1 000 m

Echelle: 1 : 25'000

Parcelle à vendre

Source carthographique:
SwissTopo
Cartes nationales (couleur)


ForêtGruyère

**Association des propriétaires forestiers**

**Rue du Centre 30**
**1637 CHARMEY**

Alexandre Pipoz
Forestier ES, Chargé d'affaires
078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch


Charmey, le 23 août 2022

# Parcelle forestière à vendre

*Plan de situation détails*

***Descriptif:***

Parcelle n° RF: 2252
Commune: Pont en Ogoz
Lieu dit: La Perreire
Surface: 0,58 ha

0 100 200 m

Echelle: 1 : 5'000

Parcelle à vendre

Source carthographique:
SwissTopo
Cartes nationales (couleur)


ForêtGruyère

**Association des propriétaires forestiers**

**Rue du Centre 30**
**1637 CHARMEY**

Alexandre Pipoz
Forestier ES, Chargé d'affaires
078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch


Charmey, le 23 août 2022

# Parcelle forestière à vendre

*Parcellaire*

***Descriptif:***

Parcelle n° RF: 2252
Commune: Pont en Ogoz
Lieu dit: La Perreire
Surface: 0,58 ha

0 75 150 m

Echelle: 1 : 2'500

Parcelle à vendre
Parcellaire_propriétaires

Source carthographique:
SwissTopo
Cartes nationales (couleur)


ForêtGruyère
**Association des propriétaires forestiers**

**Rue du Centre 30**
**1637 CHARMEY**
Alexandre Pipoz
Forestier ES, Chargé d'affaires
078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch


Charmey, le 23 août 2022

# Parcelle forestière à vendre

*Carte des stations du périmètre*

***Descriptif:***

Parcelle n° RF: 2252
Commune: Pont en Ogoz
Lieu dit: La Perreire
Surface: 0,58 ha

Echelle: 1 : 500

Carte des peuplements EB
- Parcelle à vendre

Carte des peuplements_état 09.2022
- Recrû, fourré
- Bas perchis
- Haut perchis
- Jeune futaie
- Moyenne futaie
- Vieille futaie
- Mélangé

Source carthographique:
SwissTopo
Cartes nationales (couleur)
SwissImage (Fond de plan)

ForêtGruyère
Association des propriétaires forestiers

**Rue du Centre 30**
**1637 CHARMEY**
Alexandre Pipoz
Forestier ES, Chargé d'affaires
078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch

Charmey, le 16 septembre 2022

**Attention! Seule le peuplement de la parcelle à vendre a été mis à jour**




# Parcelle forestière à vendre

*Carte des stations du périmètre*

***Descriptif:***

Parcelle n° RF: 2252
Commune: Pont en Ogoz
Lieu dit: La Perreire
Surface: 0,58 ha

0 75 150 m

Echelle: 1 : 2'500

N

Carte des peuplements
Parcelle à vendre

Parcellaire_propriétaires

Carte des peuplements
Recrû, fourré
Bas perchis
Haut perchis
Jeune futaie
Moyenne futaie
Vieille futaie
Mélangé

Source carthographique:
SwissTopo
Cartes nationales (couleur)


ForêtGruyère
Association des propriétaires forestiers

**Rue du Centre 30**
**1637 CHARMEY**
Alexandre Pipoz
Forestier ES, Chargé d'affaires
078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch


Charmey, le 16 septembre 2022

# Parcelle forestière à vendre

*Carte des stations du périmètre*

***Descriptif:***

Parcelle n° RF: 2252
Commune: Pont en Ogoz
Lieu dit: La Perreire
Surface: 0,58 ha

0 75 150 m

Echelle: 1 : 2'500

Carte des stations périmètre

- 8a, Hêtraie à Millet typique
- 8f, Hêtraie à Millet avec pulmonaire

- Parcelle à vendre
- Parcellaire_propriétaires

Source carthographique:
SwissTopo
Cartes nationales (couleur)


ForêtGruyère
Association des propriétaires forestiers

**Rue du Centre 30**
**1637 CHARMEY**
Alexandre Pipoz
Forestier ES, Chargé d'affaires
078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch


Charmey, le 23 août 2022

Canton de Berne
Office des forêts et de la nature

Canton de Fribourg
Inspection cantonale des forêts

# Clé de cartographie

# des stations forestières des cantons de Berne et Fribourg

# Commentaires sur les associations forestières

Janvier 1996

ARGE Kaufmann & Partner / Burger+Stocker — Solothurn / Lenzburg
FNP, Pédologie forestière — Birmensdorf
Traduction : Bureau Philipona & Brügger — Plaffeien


Etage montagnard inférieur (ca. 600/700 - 1000 m d' altitude)
trés sec
sec
frais
humide
mouillé
68
65
16a
2ho
15a
1aho
12e
12c
8e
8d
8a
8f
12a
8*
8s
8g
12s
12g
8b
46a
46g
29le/26a
26f/26g
46s
27a
27f/27g
30
61
16w
15w
62
12w
17
25*
13e
13a
22a
22*
22s
24*c
66
32
acide
neutre
basique
conditions variables moins extrême
éboulis stabilité croissante
associations des zones alluviales

## Explications à propos des commentaires

Les descriptions des associations sont toutes structurées de la même manière. Les descriptions sont valables pour les régions du Jura (des descriptions spécifiques à cette région seront publiés séparément), Plateau, Préalpes et Alpes des cantons de Berne et Fribourg. Les indications reposent essentiellement sur les relevés de végétation et de sol effectués de 1991 à 1994, sur les observations faites durant des visions locales et des tests de cartographie à la même période ainsi que sur des informations complémentaires issues de la littérature.

La vision d'ensemble encore lacunaire nous a seulement permis de rédiger des commentaires très succincts. La cartographie à grande échelle apportera les informations nécessaires pour caractériser avec précision une association et en cerner l'aire de distribution. Les données rudimentaires et provisoires concernant la sylviculture et la valeur naturelle seront approfondies et complétées par les expériences acquises au fur et à mesure de l'avance des travaux de cartographie et par les renseignements fournis par les forestiers et les spécialistes en matière de protection de la nature.

## Définition des abréviations et des symboles

### Numérotage

Les associations sont classifiées et numérotées principalement selon l'oeuvre de référence, encore valable, des associations forestières suisses de H. Ellenberg et F. Klötzli (1972). La désignation des sous-unités suit le principe qui a fait ses preuves depuis des années dans plusieurs cantons (BGU, 1982): les sous-unités sont désignées à l'aide de lettres, placées à la suite du nombre. Elles précisent la variation écologique par rapport à la sous-unité typique a ("centre" de l'association):

- a variante typique
- b sol plus humide et plus pauvre en bases que a
- c sol plus pauvre en bases que a
- d sol plus pauvre en bases et plus sec que a
- e sol plus riche en bases et plus sec que a
- f sol plus riche en bases que a
- g sol plus riche en bases et plus humide que a
- s sol plus humide que a (ancien $a_S$)
- w sol à humidité variable




- $._{a}$ variante appauvrie
- $._{al}$ variante sur alluvions (cône alluvial)
- $._{ho}$ variante des régions hautes ou fraîches
- $._{ti}$ variante des régions basses ou douces
- $._{lu}$ variante à humidité de l'air
- $._{bl}$ variante sur éboulis de bloc
- $._{fe}$ variante sur rochers

- $._{ex}$ en transition (forêt riveraine plus inondée)
- $._{kk}$ variante de crête
- $._{ha}$ variante de pente
- $._{ps}$ variante pseudogleyifiée
- $._{ka}$ variante sur calcaire
- $._{pi}$ variante pionnière
- $._{A}$ présence dominante d'une espèce

L'index "*" (ex. 22*) désigne des associations qui n'étaient pas décrites par E+K. Elles ont été rattachées à l'association forestière la plus proche selon E+K.

### Situation

**Relief**



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** plateau



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** sommets, crêtes



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** versants et sommets



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** versants



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** toutes situations



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** terrains plats



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** combes, pieds de versants



**Erreur ! Les arguments du commutateur ne sont pas spécifiés.** combes, vallons

## Végétation

Les espèces fréquentes et importantes pour le diagnostic sont mentionnées dans les commentaires. Les espèces dominantes sont écrites en caractères gras. Les noms des espèces (à l'exception des mousses) correspondent en général à ceux de la flore du canton de Berne „Flora des Kantons Bern" (Lauber, Wagner 1991).

Strate arborescente: liste des essences croissant dans la forêt naturelle; les essences rares sont mentionnées entre parenthèses.

Strate arbustive et strate herbacée

Strate muscinale

**Feuillus**

| | |
|---|---|
| ali'bl | alisier blanc |
| ali'tor | alisier torminal |
| boul | bouleau |
| cha | charme |
| ch'p | chêne pédonculé |
| ch'pub | chêne pubescent |
| ch'r | chêne rouvre |
| er'ch | érable champêtre |
| er'p | érable plane |
| er's | érable sycomore |
| fr | frêne |
| hê | hêtre |
| mer | merisier |
| mer'gr | merisier à grappes |
| noy | noyer |
| or'm | orme de montagne |
| saule | saule |
| sorb'oi | sorbier des oiseleurs |
| ti'gr | tilleul à grandes feuilles |
| ti'pf | tilleul à petites feuilles |
| tr | peuplier tremble |
| ver'bl | verne blanche |
| ver'n | verne noire |

**Résineux**

| | |
|---|---|
| ar | arolle |
| pin'm | pin de montagne |
| if | if |
| ép | épicéa |
| pin's | pin sylvestre |
| mél | mélèze |
| sa | sapin |

## Sol

Les explications détaillées concernant les caractéristiques des sols sont contenues dans la clé de l'utilisateur.

### Types de sol

Sols bruts ($A_h$-C)

| | | |
|---|---|---|
| Re | rendzine | roche calcaire |
| PR | pararendzine | roche mixte |
| Rg | régosol (roche meuble) | roche mixte |
| Ra | ranker | roche silicatée |

Sols altérés (A-B-C):

- Bc sol brun calcaire
- Br sol brun

Sols altérés avec migration (A-(E)-$B_t$-C)/(A-E-$B_h$-$B_{fe}$-C)

- Bl sol brun lessivé (lessivage de l'argile)
- Bp sol brun podzolisé
- Po podzol

Sols hydromorphes (A-$S_w$-$S_d$)/(A-ES-S)/A-$G_o$-$G_r$)

- Ps pseudogley (eau stagnante, tassement)
- Sg stagnogley (éluviation hydromorphe)
- G gley (horizons d'oxydation et de réduction)
- Gp gley de pente

### Désignation des horizons

Horizons organiques

- L horizon de litière
- F horizon de fermentation
- H horizon organique

Horizons supérieurs du sol

- A horizon de surface (matière minérale mélangée avec la matière organique)
- $A_h$ matière minérale mélangée avec de l'humus
- $A_{hh}$ couleur noirâtre (ralentissement dans le processus de mélange)
- $A_a$ horizon de type anmoor, humide à mouillé, foncé, partiellement anaérobique

Horizons de matière minérale

- B altéré, coloré en brun (accumulation)
- $B_v$ net brunissement
- $B_{fe}$ couleur rougeâtre, accumulation de fer après lessivage
- $B_h$ couleur noirâtre, accumulation de matière organique
- $B_t$ accumulation d'argile après migration (masque d'argile, texture prismatique)
- C matériau d'origine (sous-sol pas influencé par la pédogenèse)
- $C_v$ début d'altération
- E horizon éluvial, décoloré (couleur claire), appauvri; valable aussi bien pour le lessivage de l'argile et du fer que pour celui de la matière organique
- S horizon d'eau stagnante (coloration rouge-pâle, taches de rouille, concrétions de Mn)
- $S_w$ eau stagnante
- $S_d$ zone de rémanence (fortement tassé)

G horizon de gley
$G_o$ taches de rouille
$G_r$ couleurs de réduction (gris, bleuâtre)

T horizon tourbeux

( ) faiblement marqué
/ présence contigüe de caractéristiques ou horizons différents
[ ] présence discontinue

**Carte des aptitudes des sols**

Liste des unités de cartographie selon la carte des aptitudes des sols de la Suisse de 1980, à l'échelle 1:200'000 :

**Plateau**

F Plaines des régions basses

- F1 marais, tourbières
- F2 graviers
- F3 alluvions récentes, argileuses
- F4 alluvions récentes, sableuses

G Collines morainiques

- G1 combes, bassins de surcreusement glaciaire, moraines de fond, marais
- G2 plaines graveleuses fluvio-glaciaires
- G3 dos, drumlins peu marqués, moraines terminales
- G4 alluvions fines

H Basses collines molassiques partiellement recouvertes de moraines

- H3 pentes raides, surtout molasse, inclinaison > 25%
- H4 combes, rigoles d'accumulation
- H5 plateaux légèrement ondulés et terrasses, moraines/molasse sableuses
- H6 versants, inclinaison < 25%
- H7 deckenschotter (graviers)

J Vallées alluviales du Plateau

- J1 alluvions fines
- J2 alluvions graveleuses

K Moyennes collines molassiques avec formes glaciaires locales

- K1 plateaux et terrasses, molasse à grain fin
- K2 versants, molasse à grain fin, inclinaison < 25 %
- K3 pentes raides, molasse à grain fin, inclinaison > 25 %
- K4 combes, rigoles d'accumulation

N Hautes collines molassiques (Napf)

- N1 sommets, aplanissement, inclinaison < 25 %
- N2 versants, inclinaison < 35 %
- N3 pentes raides, inclinaison > 35 %
- N4 combes, rigoles d'accumulation

**Bord des Alpes**

O Molasse sableuse du Bord des Alpes

- O1 zones planes, inclinaison < 10 %
- O2 versants, inclinaison < 35 %
- O3 pentes raides, exposition générale au sud, inclinaison > 35 %
- O4 pentes raides, exposition générale au nord, inclinaison > 35 %
- O5 combes, rigoles d'accumulation

P Poudingue prédominant du Bord des Alpes

- P1 sommets et versants traversés de bancs rocheux
- P3 versants, exposition générale au sud, Suisse occidentale, inclinaison < 35 %
- P4 pentes raides, exposition générale au sud, inclinaison > 35 %
- P6 versants, exposition générale au nord, Suisse occidentale, inclinaison < 35%
- P7 pentes raides, exposition générale au nord, inclinaison > 35 %
- P8 combes

**Alpes**

Q Vallées alpines larges

R Vallées alpines étroites

- 1 alluvions fines
- 2 alluvions graveleuses
- 3 alluvions à nappe phréatique, marais
- 4 cônes d'alluvions
- 5 cônes de déjection

S Régions sur flysch, principalement dans les Alpes septentrionales

U Régions alpines sur formation calcaire

V Régions alpines sur formations cristallines dures

Sous-unités des unités physiographiques S,U et V:

- 1 crêtes et versants traversés de bancs rocheux
- 2 versants supérieurs exposés au sud (au-dessus de 1'500 m), inclinaison < 35 %
- 3 versants supérieurs exposés au nord (au-dessus de 1'500 m), inclinaison < 35 %
- 4 versants inférieurs exposés au sud (au-dessous de 1'500 m), inclinaison < 35 %
- 5 pentes raides exposées au sud, inclinaison > 35 %
- 6 versants inférieurs exposés au nord (au-dessous de 1'500 m), inclinaison < 35 %
- 7 pentes raides exposées au nord, inclinaison > 35 %
- 8 combes

**Typogramme des horizons supérieurs du sol**

Description du spectre des différentes formes d'humus. Le spectre est caractérisé à l'aide d'un tramage. Lorsque le tramage présente une variation d'intensité, la zone la plus claire indique les formes d'humus rares.

Formes d'humus:

1 mull typique
2 mull de type moder
3 moder de type mull
4 moder typique, pauvre en humus fin
5 moder typique, riche en humus fin
6 moder de type humus brut
7 humus brut typique, pauvre en humus fin
8 humus brut typique, riche en humus fin
9 anmoor
10 tourbe

**Horizon minéral: valeur du pH**

ZPE zone principale d'enracinement
ZSE zone secondaire d'enracinement

**Typogramme des horizons minéraux:**

Description du spectre des différents types de sol, sous considération de la perméabilité.
Lorsque le tramage présente une variation d'intensité, la zone la plus claire indique les types de sols resp. les perméabilités rares.

## Sylviculture/Production

### Choix des essences

En plus des recommandations générales quant aux essences principales appropriées, nous avons mentionné pour chaque association de la forêt de feuillus et de la forêt mixte jouant un rôle économique important, des données basées sur l'expérience concernant la proportion minimale de feuillus:

| | |
|---|---|
| état naturel: | proportion minimale de feuillus pour que le peuplement puisse être considéré comme étant proche de l'état naturel (cat. I selon clé complémentaire pour la définition des peuplements à caractère proche ou éloigné de l'état naturel), |
| minimale: | proportion minimale de feuillus requise pour des raisons écologiques, afin que les conditions du sol et de la végétation ne soient pas modifiées (limite supérieure de la cat. II, éloigné de l'état naturel, selon clé complémentaire). |

# 8a Hêtraie à Millet typique
Milio-Fagetum typicum

## Distribution:
Plateau et Préalpes, Jura en présence de molasse et de moraine.

## Station:
étage montagnard inférieur, toutes expositions et inclinaisons, très à l'ombre, en présence d'air humide à l'étage submontagnard. géologie: moraine, molasse.

## Situation:

Relief:



Exposition:




Altitude:




Ecogramme de l'association:




## Impression/Aspect:
hêtraie bien productive avec sapin, nombre élevé de tiges, souvent complété par le peuplement accessoire, les fougères occupent une position importante au sein de la strate herbacée relativement luxuriante.

## Végétation:
**Strate arborescente:**
**hê**, sa, (ép, er's, fr)

**Strate arbustive:**
framboisier, ronce spec., sureau noir, chèvrefeuille noir

**Strate herbacée:** gaillet odorant, lamier galéobdolon, millet étalé, polygonate multiflore, carex des forêts, oxalis petite-oseille, polystic lobé, dryoptéris de Linné, **fougère mâle**, **fougère femelle**, barbe-de-bouc

**Strate muscinale:** --

## Sol:
**Généralités:**
***Type de sol:*** sol brun acide et sol brun lessivé parfois légèrement pseudogleyifié.

***Séquence des horizons:***
L-$A_h$-B-BC-$C_v$
L-$A_h$-EB-(S)$B_t$-$C_v$

***Remarques particulières:***
horizon $B_t$ souvent avec une légère hydromorphie.

***Carte des aptitudes des sols:***
unités: H3, H5, H6, K3, N3, P2

**Horizons supérieurs:**
***Forme d'humus:*** mull typique ou de type moder.

***Activité biologique*:** défécations des lombrics apparentes, horizon $A_h$ grumeleux.

***Valeur du pH: 4***



Typogramme des horizons supérieurs du sol

**Horizon minéral:**
***Evolution du sol:*** prononcée, forte altération, lessivage de l'argile, limite du calcaire à plus de 120 cm.

***Perméabilité:*** normale à légèrement entravée (dès env. 30 cm), dans ce cas concrétions de manganèse ponctuelles, taches de rouille et coloration rouge-pâle.

***Valeur du pH:***
ZPE 4-5 ZSE 4.5-7



Typogramme des horizons minéraux

## Sylviculture/Production:
**Choix des essences:**
hê, er's, sa, ép, fr, or'm
Proportion feuillus état naturel: 80 %
Proportion feuillus minimale: 50 %

**Rajeunissement/Soins:**
rajeunissement naturel possible sans difficulté.

**Indice de fertilité:**
bonne à très bon.

## Valeur naturelle:
fréquente

# 8f Hêtraie à Millet avec Pulmonaire
Milio-Fagetum pulmonarietosum

## Distribution:
Plateau, Préalpes, Jura en présence de molasse et moraine.

## Station:
étage montagnard inférieur, toutes expositions et inclinaisons, sols profonds, riches en bases et frais.
géologie: moraine, molasse.

## Situation:

Relief:



Exposition:




Altitude:




Ecogramme de l'association:




## Impression/Aspect:
hêtraie bien productive à longs fûts avec sapins.

## Végétation:
**Strate arborescente:**
**hê**, sa, er's, fr

**Strate arbustive:**
framboisier, ronce spec., sureau noir

**Strate herbacée:** gouet, gaillet odorant, pulmonaires, lamier galéobdolon, carex des forêts, fétuque des bois, fougère femelle, actée en épi, polystic lobé

**Strate muscinale:** --

## Sol:
**Généralités:**
***Type de sol:*** sol brun ou sol brun lessivé, parfois faiblement pseudogleyifié.

***Séquence des horizons:***
L-[F]-$A_h$-B-$C_v$
L-[F]-$A_h$-(E)B-$B_{(t)}$-$C_v$

***Remarques particulières:***
en surface modérément acide.

***Carte des aptitudes des sols:***
unités: H3, H5, H6, U7

**Horizons supérieurs:**
***Forme d'humus:*** mull typique.

***Activité biologique*:** bonne décomposition de la matière organique en surface par les lombrics, horizon $A_h$ grumeleux.

***Valeur du pH:*** 5-6

| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tourbe | anmoor | humus brut | | moder | | | | mull | |

Typogramme des horizons supérieurs du sol

**Horizon minéral:**
***Evolution du sol:*** prononcée, forte altération, lessivage modéré de l'argile, limite du calcaire à plus de 100 cm.

***Perméabilité:*** normale, parfois concrétions de manganèse ponctuelles.

***Valeur du pH:***
ZPE 4-6 ZSE 4-7

| PERMÉABILITÉ | sols bruts | sols bruns | sols bruns lessivés | podsol | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | forte |
| | | | | | P normale |
| | | | | | entravée |

Typogramme des horizons minéraux

## Sylviculture/Production:
**Choix des essences:**
hê, er's, sa, ép, fr, or'm; pas d'essences thermophiles
proportion feuillus état naturel: 80 %
proportion feuillus minimale: 50 %

**Rajeunissement/Soins:**
rajeunissement naturel possible sans difficulté, jardinage possible si la proportion de sapin est élevée.

**Indice de fertilité:**
très bon.

## Valeur naturelle:
grande variété d'espèces avec des indicateurs de l'étage montagnard.

Formulaire 13

# Récapitulation des résultats

Arrondissement : 3

Triage : 3.1

## La Perreire

Révision : 2022

**Commune de Pont-en-Ogoz** **Surface forestière : 0.58 ha**

**Massifs forestiers :** **RF n°: 2252**

## Répartition par stade de développement ( feuille 21)




| Stades | | Diamètre dom. (cm) |
|---|---|---|
| 100 | recrû et fourré | 0 - 10 |
| 200 | bas perchis | 11 - 20 |
| 300 | haut perchis | 21 - 30 |
| 400 | jeune futaie | 31 - 40 |
| 500 | futaie moyenne | 41-50 |
| 600 | vieille futaie | > 50 |
| 700 | étagé | |

**Matériel sur pied** **523** sv/ha*
(feuilles 31 et 32)

**Nombre de tiges** **456** ti/ha

**Pourcentage de résineux** **96%** du volume
(tous les stades confondus)

**Accroissement** **8.6** sv/ha/an*
(feuille 33) **5** sv/an*

## Répartition des essences (volume)




## Particularités

* sv: volume sur pied (sylve); 1 sv équivaut env. à 1.0 m3 de bois mesuré après abattage.